



定期予防接種のお知らせ



お子さんが受ける定期予防接種は、免疫がつきやすいように、接種年齢や回数・間隔などが法律で決められています。

決められた接種年齢・回数・接種間隔などをきちんと守って受けましょう。【問合せ先】健康福祉課健康対策係(保健センター)0225-53-4990

種類(色)	回数	接種時期・間隔	種類(色)	回数	接種時期・間隔
ヒブ (若竹色)	4回	生後2ヶ月～5歳の誕生日前日まで	四種混合 (レモン色)	4回	生後2ヶ月～7歳6ヶ月になる前日まで
		1回目 生後2ヶ月～ 2回目 1回目から27日以上の間隔をおく 3回目 2回目から27日以上の間隔をおく 追 加 3回目から7～18ヶ月の間隔をおく ※生後7ヶ月以降に1回目を接種する場合は、回数が異なるため、医師に相談してください。			1回目 生後2ヶ月～ 2回目 1回目から20日以上の間隔をおく 3回目 2回目から20日以上の間隔をおく 追 加 3回目から12～18ヶ月の間隔をおく
小児肺炎球菌 (水色)	4回	生後2ヶ月～5歳の誕生日前日まで	二種混合 (若草色)	1回	11歳以上13歳になる前日まで 標準的な接種期間は小学校6年生の間。 ※対象者へ通知します
		1回目 生後2ヶ月～ 2回目 1回目から27日以上の間隔をおく 3回目 2回目から27日以上の間隔をおく 追 加 3回目終了後60日以上の間隔をおいて、 生後12ヶ月になった日以降に1回接種する ※生後7ヶ月以降に1回目を接種する場合は、回数が異なるため、医師に相談してください。			1歳の誕生日前日まで 標準的な接種期間は生後5ヶ月～8ヶ月の間 BCGの指定医療機関は女川町地域医療センターのみになります。
B型肝炎 (銀鼠色)	3回	1歳の誕生日前日まで	BCG(青)	1回	1歳の誕生日前日まで
		1回目 生後2ヶ月～ 2回目 1回目から27日以上の間隔をおく 3回目 1回目から139日以上の間隔をおく			麻しん風しん (白茶色)
ロタウイルス (さくら色)	2回	1価 生後6週以後生後24週まで	日本脳炎 (藤色)	2回	1歳～3歳の誕生日前日まで
		1回目 生後6週～ 2回目 1回目から4週間以上の間隔をおく			初回 標準的な接種期間は生後12ヶ月～15ヶ月未満 追 加 1回目から3ヶ月以上の間隔をおく
	3回	5価 生後6週以降生後32週まで		4回	1期 生後6ヶ月～7歳6ヶ月になる前日まで
		1回目 生後6週～ 2回目 1回目から4週間以上の間隔をおく			1回目 標準的な接種期間は3歳～4歳 2回目 1回目から6～28日以上の間隔をおく 追 加 2回目からおおむね1年おく
		3回目 1回目から4週間以上の間隔をおく			2期 9歳～13歳の誕生日前日まで 標準的な接種期間は9歳～10歳の間 ※1期、2期とも対象者へ通知します。

令和6年4月1日からヒブワクチンと四種混合ワクチンが一緒になりました。

- これから初めてワクチンを受けるお子さん
- 五種混合ワクチンを受けたことがあり、追加接種まで完了していないお子さん
→五種混合ワクチンを受けましょう。
- ヒブと四種混合ワクチンを受けたことがあり、追加接種まで完了していないお子さん
→引き続きヒブと四種混合ワクチンを受けましょう。



(ヒブ+四種混合) 五種混合 (薄紅色)

生後2ヶ月～7歳6ヶ月になる前日まで

- | | |
|-----|-------------------|
| 1回目 | 生後2ヶ月～ |
| 2回目 | 1回目から20日以上の間隔をおく |
| 3回目 | 2回目から20日以上の間隔をおく |
| 追 加 | 3回目から6～18ヶ月の間隔をおく |