

# 定期予防接種のお知らせ

お子さんが受ける定期予防接種は、免疫がつきやすいように、接種年齢や回数・間隔などが法律で決められています。決められた接種年齢・回数・接種間隔などをきちんと守って受けましょう。

種類（色）	回数	接種時期・間隔	種類（色）	回数	接種時期・間隔
ヒブ (若竹色)	4回	生後2ヶ月～5歳の誕生日前日まで	四種混合 (レモン色)	4回	生後3ヶ月～7歳6ヶ月になる前日まで
		1回目 生後2ヶ月～ 2回目 1回目から27日以上の間隔をおく 3回目 2回目から27日以上の間隔をおく 追加 3回目から7ヶ月以上の間隔をおく ※生後7ヶ月以降に1回目を接種する場合は、回数が異なるため、医師に相談してください。			1回目 生後3ヶ月～ 2回目 1回目から20日以上の間隔をおく 3回目 2回目から20日以上の間隔をおく 追加 3回目から12ヶ月以上の間隔をおく
小児肺炎球菌 (水色)	4回	生後2ヶ月～5歳の誕生日前日まで	二種混合 (若草色)	1回	11歳以上13歳になる前日まで 標準的な接種期間は小学校6年生の間。 ※対象者へ通知します
		1回目 生後2ヶ月～ 2回目 1回目から27日以上の間隔をおく 3回目 2回目から27日以上の間隔をおく 追加 3回目終了後60日以上の間隔をおいて、 生後12ヶ月になった日以降に1回接種する ※生後7ヶ月以降に1回目を接種する場合は、回数が異なるため、医師に相談してください。	BCG(青)	1回	1歳の誕生日前日まで 標準的な接種期間は生後5ヶ月～8ヶ月の間 BCGの指定医療機関は女川町地域医療センターのみになります。
B型肝炎 (銀鼠色)	3回	1歳の誕生日前日まで	麻しん風しん (白茶色)	2回	1期 1歳～2歳の誕生日前日まで 麻しん風しんは1歳になったらすぐに接種しましょう！ 2期 小学校就学の前年度 ※対象者には通知します
		1回目 生後2ヶ月～ 2回目 1回目から27日以上の間隔をおく 3回目 1回目から139日以上の間隔をおく			水痘 (オレンジ)
ロタウイルス (さくら色)	2回	1 価 生後6週以後生後24週まで	日本脳炎 (藤色)	4回	1期 生後6ヶ月～7歳6ヶ月になる前日まで 1回目 標準的な接種期間は3歳～4歳 2回目 1回目から6～28日以上の間隔をおく 追加 2回目からおおむね1年おく
		1回目 生後6週～ 2回目 1回目から4週間以上の間隔をおく			2期 9歳～13歳の誕生日前日まで 標準的な接種期間は9歳～10歳の間 ※1期、2期とも対象者へ通知します。
	3回	5 価 生後6週以降生後32週まで			
		1回目 生後6週～ 2回目 1回目から4週間以上の間隔をおく 3回目 1回目から4週間以上の間隔をおく			



2ヶ月になったら、ヒブ・小児肺炎球菌・B型肝炎・ロタウイルスを医師の判断により同時接種を受けることができます。

【問合せ先】

女川町役場 健康福祉課 健康対策係 0225-54-3131 (内線133)